

Depo-Provera® - La inyección

Cómo:

La inyección Depo-Provera® (o Depo) se la aplica su proveedor de la atención médica aproximadamente cada 12 semanas. Tiene una hormona y funciona impidiendo que el cuerpo libere un óvulo. También espesa el moco cervicouterino (el líquido en la entrada del útero) para impedir que el espermatozoides llegue al óvulo.

Cuándo:

Depo puede empezar a usarse en cualquier momento, siempre y cuando usted no esté embarazada.

Dónde:

Un proveedor de la atención médica le aplica una inyección durante una visita clínica.

Ventajas:

La inyección funciona muy bien y dura tres meses. Usted no necesita tomar una píldora todos los días. Es un método privado que nadie más nota. Usted puede usar Depo mientras amamanta y protege contra algunos tipos de cáncer.

Desventajas:

No hay manera de detener los efectos de la inyección una vez que se ha aplicado. Debe agotarse.

Efectos secundarios:

Usted tendrá cambios en sus períodos menstruales. Al principio, podría haber sangrado en momentos irregulares.

De solicitarse, este documento se facilitará en otro formato a personas con discapacidades o en otro idioma, aparte del inglés, a personas con un nivel de inglés limitado. Para solicitar esta publicación en otro formato o idioma, comuníquese con el Programa de Salud Reproductiva al 971-673-0355 o llame al 711 (teléfono de texto o teletipo; TTY, por sus siglas en inglés) si tiene alguna discapacidad auditiva o impedimento del habla.

Spansih 2015



La mayoría de las mujeres dejan de tener períodos después de algunas pocas inyecciones. Pueden transcurrir algunos meses antes de que los períodos regresen a la normalidad después de que deje de usar Depo, pero usted podría quedar embarazada inmediatamente si este se agota y usted no usa otro método. Otros efectos secundarios podrían incluir aumento de peso y dolores de cabeza.

Riesgos:

Usted no debería usar Depo si tiene cáncer de mama en este momento. Depo puede causar pérdida de calcio óseo. El calcio retorna cuando usted deja de usar Depo. Depo no la protege de VIH/ETS.

Eficacia:

Menos de 1 de cada 100 mujeres quedan embarazadas cada año si siempre se ponen la inyección puntualmente.

Aproximadamente 6 de cada 100 mujeres quedan embarazadas cada año si no se ponen siempre la inyección puntualmente.