

¿Qué es el implante anticonceptivo?

El implante, llamado Nexplanon®, es una varilla de plástico del tamaño de un cerillo aproximadamente (unas 2 pulgadas). Un proveedor de atención médica coloca la varilla debajo de la piel en la parte superior del brazo. Dura 3 años.

¿Cómo funciona?

El implante impide que:

- Los ovarios liberen óvulos.
- El espermatozoides pase al útero.
- Los óvulos fertilizados se adhieran al útero.

¿Cuán eficaz es el implante?

- El implante tiene una eficacia del 99%.
- *Es el método anticonceptivo más eficaz de todos.*

¿Por qué habría de usar el implante?

- Dura 3 años.
- No hay nada que recordar después de haberse colocado.
- Con el implante se puede dar de lactar sin problemas.
- La dosis de hormonas es muy baja y tiene pocos efectos secundarios.
- Disminuye el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cánceres.
- Es práctico y le brinda tranquilidad.

¿Cómo se usa el implante?


- Quizá sea necesario que utilice un método anticonceptivo de apoyo con el implante durante los primeros 7 días.
- El implante debe retirarse cada 3 años, pero puede retirarse antes.

¿Qué tipo de efectos secundarios son comunes?

Sus periodos cambiarán. Cuando se le retire el implante, sus periodos volverán a como eran antes de que le colocaran el implante.

- **La mayoría** de las mujeres presentan un leve sangrado esporádicamente.
- Puede dejar de tener periodos.
- **Algunas** mujeres presentan:
 - Cambios de humor,
 - Dolores de cabeza.

La mayoría de los efectos secundarios desaparecen al retirarse el implante.



¿Qué debo hacer si quiero que me retiren el implante?

- Vaya a ver a un proveedor que retire implantes.
- Si desea seguir usando el implante, pida que le coloquen otro cuando le retiren el que tiene.
- No se olvide de usar otro método anticonceptivo de inmediato si no desea quedar embarazada.

¿Hay riesgos con el implante?

- No protege de las ETS o del VIH. Use condones.
- Después de colocársele el implante en el brazo, usted podría presentar dolor, irritación, hinchazón, magulladura o infección.
- Su remoción podría ser difícil.



Llame a su proveedor de atención médica si presenta:

- Dolores de cabeza severos o más frecuentes, sangrado fuerte o dolor en el abdomen.
- Pus, sangrado, irritación o dolor sobre el implante.

Llame a su proveedor de atención médica si no siente el implante debajo de la piel.

Llame al 9-1-1 o acuda a la sala de emergencias si presenta:

- Dolor con presión en el pecho.
- Cambios súbitos de la vista.

Para ver si puede obtener métodos anticonceptivos gratis o de bajo costo en Oregon, llame al 2-1-1 o visite ccare.oregon.gov


Oregon
Health
Authority
PUBLIC HEALTH DIVISION

Llame al 971-673-0355 para obtener este panfleto en otro formato: letra grande, otros idiomas, Braille y grabaciones de audio, entre otros.

Puede descargar este panfleto en www.healthoregon.org/rh e imprimirlo.

Financiado en parte por una subvención de la OPA del DHHS de EE.UU.
2013

Implante anticonceptivo



¡El implante es el método anticonceptivo más eficaz de todos!