

Vacunas para las mujeres embarazadas

Las mujeres embarazadas que han recibido todas sus vacunas se protegen y protegen a sus recién nacidos de enfermedades que pueden prevenirse mediante la vacunación.

Utilice la tabla a continuación al momento de considerar vacunarse durante el embarazo:

Vacunas seguras durante el embarazo:

Tétano y difteria (Td)
Tdap (tétano, difteria, tos ferina)
>20 semanas de gestación
Inyección contra la gripe (no activada)

Consulte con su médico antes de recibir las vacunas siguientes:

Hepatitis A
Hepatitis B
Meningococo
Neumococo

No reciba las vacunas siguientes durante el embarazo:

MMR (sarampión, paperas y rubéola)
Varicela
Spray nasal contra la gripe

Recomendadas después de dar a luz:

Tdap (tétano, difteria, tos ferina) si no la recibió antes de dar a luz
MMR
Varicela
HPV o VPH (hasta los 26 años de edad)

Para proteger a su bebé de la tos ferina, asegúrese de que todos los miembros de su unidad familiar y los cuidadores estén vacunados contra la tos ferina antes de llevar a su bebé a la casa. Los bebés de menos de 6 meses de nacidos tienen una mayor probabilidad de morir de esta enfermedad.

¿Pueden los niños en mi unidad familiar vacunarse mientras estoy embarazada?

Durante su embarazo, los niños pueden recibir todas las vacunas de rutina recomendadas sin que usted o su bebé corran peligro.

¿Interfiere la lactancia con las vacunas?

No, mientras usted esté dando de lactar puede recibir las vacunas recomendadas sin que ello ponga a su bebé en peligro. Tanto la leche materna como las vacunas del bebé ayudarán a apoyar su sistema inmunológico.

¿Dónde puedo obtener las vacunas?

Usted puede vacunarse en el consultorio de su proveedor médico, el departamento de salud del condado en el que reside o la farmacia.

Para obtener más información

Oregon211info

211info.org

Marque 211 ó 1-800-723-3638

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

www.cdc.gov/spanish/inmunizacion/index.html

1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)