

## Vacunas infantiles

Los niños que han recibido todas sus vacunas tienen una mayor probabilidad de estar protegidos contra enfermedades y una probabilidad menor de transmitir a otras personas enfermedades que pueden prevenirse mediante la vacunación.

- Muchos padres no saben que las enfermedades como el sarampión y la tos ferina todavía existen y que pueden afectar gravemente a sus bebés.
- Las vacunas para bebés pueden proteger a su hijo de muchas enfermedades infantiles peligrosas.
- La vacunación del bebé empieza desde que nace. Pídale a su proveedor médico o enfermera que se asegure de que su bebé reciba la primera vacuna para la hepatitis B antes de salir del hospital.
- Una sola dosis no es suficiente. Las vacunas se administran en serie. La serie empieza cuando el bebé nace.
- Su hijo necesita por lo menos seis visitas de vacunación antes de cumplir los 2 años de edad.
- Si su bebé se salta una vacuna recomendada, no vuelva a empezar; basta con que lo lleve nuevamente a su proveedor para que reciba la siguiente dosis de la serie.
- Lleve un registro. Asegúrese de pedirle a su proveedor de atención médica un registro de vacunación. Lleve el registro consigo a cada una de las visitas médicas y haga que lo llenen cada vez que el bebé reciba una vacuna. Usted deberá presentar este registro si matricula a su hijo en un centro de cuidado infantil o en la escuela.
- Si cambia de proveedor o de clínica, pida al proveedor o clínica nuevos que se comuniquen con ALERT IIS para que tengan acceso al historial de vacunación de su hijo.

Para obtener más información

Usted podría ser elegible para que su hijo reciba vacunas gratuitas o a bajo costo. Para informarse más al respecto, comuníquese con:

- El **proveedor de atención médica** o enfermera de su bebé;
- El **departamento de salud del condado en el que usted reside**; u
- **Oregon 211info** marcando 211 ó 1-800-723-3638. También puede visitar [211info.org](http://211info.org) en Internet.

*continúa en la página siguiente*

## Vacunas infantiles (continuación)

Programa de vacunas infantiles y las enfermedades contra las que protegen.

### Al nacer

- **La vacuna HepB (Hepatitis B) protege contra:** la hepatitis B; un virus que puede producir una infección grave y enfermedad del hígado, incluido el cáncer.

### 2 meses

- **HepB**
- **La vacuna DTaP (Difteria, tétano, tos ferina) protege contra:** la difteria, la cual afecta la nariz y garganta y dificulta la respiración. Puede provocar problemas a los nervios, la inflamación del corazón e incluso la muerte. La difteria puede producir una infección grave y enfermedad del hígado, incluido el cáncer. **El tétano o tétanos**, el cual produce espasmos musculares dolorosos, cobra la vida de prácticamente la mitad de sus víctimas. La **tos ferina**, la cual provoca accesos de tos peligrosos que dificultan la respiración, puede causar neumonía, convulsiones y, en ocasiones, la muerte.
- **La vacuna Hib (*Haemophilus influenzae* tipo B) protege contra:** el *Haemophilus influenzae* tipo B, el cual provoca la inflamación del cerebro, lo cual puede traducirse en daños permanentes o la muerte. Puede causar infecciones en la sangre, articulaciones, la garganta o el corazón.
- **La vacuna de poliomielitis protege contra:** La poliomielitis, la cual causa parálisis en los músculos. La mayoría de las personas afectadas no se recuperan por completo.
- **La vacuna PCV (neumocócica) protege contra:** La enfermedad por neumococo, la cual es una de las causas principales de las infecciones de oído, meningitis, neumonía, sinusitis e infecciones de la sangre, entre otros, en niños.
- **La vacuna del RV (Rotavirus) protege contra:** La infección por rotavirus, la cual puede producir diarrea, vómitos, fiebre y deshidratación en bebés y niños pequeños.

### 4 meses

- DTaP
- Hib
- Poliomielitis
- PCV
- RV

### 6 meses

- HepB
- DTaP
- Hib
- La vacuna contra la influenza protege contra: La gripe, la cual es una enfermedad sumamente contagiosa que produce síntomas de resfriado y fiebre. En los niños de menos de 1 año de edad, puede convertirse en neumonía, la cual requiere de hospitalización.
- Poliomielitis
- PCV
- RV

### 12 meses

- DTaP
- Hib
- PCV
- **La vacuna MMR (sarampión, paperas, rubéola) protege contra:** El **sarampión**, el cual produce la erupción de la piel y fiebre alta. Puede causar sordera, daños al cerebro o la muerte. **Las paperas**, las cuales pueden provocar inflamación en los ganglios del cuello, daños a los nervios y sordera. **La rubéola**, que suele ser una enfermedad leve en los niños. Sin embargo, si una mujer embarazada contrae rubéola, podría perder a su bebé o éste podría nacer sordo o con otros problemas.
- **La vacuna contra la varicela protege contra:** La varicela, la cual suele ser una enfermedad leve en los niños sanos. Si se trata de un caso severo, podría causar una infección mortífera.
- **La vacuna HepA (hepatitis A) protege contra:** La hepatitis A, la cual es una enfermedad del hígado que puede provocar fiebre, falta de apetito, náuseas y dolor en el abdomen.

### 15 a 24 meses

- HepA
- Influenza
- Vacunas de puesta al día